



Wundverhalten nach chirurgischen Eingriffen

Um Schwellungen zu vermeiden, kühlen Sie das Wundgebiet nach der Operation mit einem Cold Pad.



Es wird ein Tupfer auf die frische Wunde gelegt, Sie müssen ihn durch Aufbeißen fixieren und diese Wundkomresse je nach Blutung nach 30- 60 Minuten entfernen.



Sollte eine Nachblutung auftreten, so legen Sie einen frischen Tupfer auf die Wunde und beißen Sie zu, um die Blutung zu stoppen. Nicht spülen.

Schmerzen im Wundgebiet nach dem Abklingen der Spritzenwirkung sind normal. Sie können notfalls Schmerztabletten einnehmen.



Essen Sie erst wieder, wenn das volle Gefühl an der betäubten Stelle wiedergekehrt ist. Es empfiehlt sich in den ersten Tagen nach dem Eingriff nicht heiss zu essen oder zu trinken.

Keine körperlichen Anstrengungen oder Sport in der ersten Woche nach dem Eingriff (Nachblutungsgefahr).

In den ersten 3 Tagen nach dem Eingriff sollte auf Rauchen und Alkoholkonsum verzichtet werden. Abhängig von der empfohlenen Medikamentenaufnahme kann sich Alkoholkonsum negativ auswirken.

Zahnpflege sorgfältig weiter betreiben. Den unmittelbaren Wundbereich vorsichtig reinigen.

Zahnpfleg Spülen Sie in der ersten Woche 2–3-mal täglich mit dem Wirkstoff Chlorhexidin zur Desinfektion. Den unmittelbaren Wundbereich vorsichtig reinigen.



Kommen Sie zum Kontrolltermin. Die Nachsorge ist notwendig.